

طرح عرضه واکسین کرونا به جوانان بین ۱۶ و ۱۷ سال

حکومت پلان دارد که بعد از واکسیناسیون کامل افراد بالاتر از ۱۸ سال، برای نو جوانان ۱۶ و ۱۷ سال نیز واکسین کرونا را تزریق کند. در این مورد تصمیم نهایی در ماه سپتامبر اتخاذ خواهد شد.

انستیتوت صحت عامه ناروی به اساس معلومات موجود توصیه می کند که بعد از واکسیناسیون کامل افراد بالاتر از ۱۸ سال، به افراد ۱۶ و ۱۷ سال نیز واکسین کرونا عرضه شود. ما در آینده تجارب و معلومات بیشتری را از کشور های دریافت خواهیم کرد که برای نوجوانان واکسین را تزریق می کنند.

وزیر صحت عامه و خدمات مراقبتی، بنت هوپه، می گوید: ما می خواهیم که قبل از تطبیق واکسین برای افراد زیر ۱۸ سال در ناروی، در مورد مؤثریت و عوارض جانبی واکسین تا حد امکان معلومات و تجارب بیشتر کسب کنیم. بنابراین تصمیم نهایی در مورد تطبیق واکسیناسیون برای افراد ۱۶ و ۱۷ سال الی ارزیابی های جدید انستیتوت صحت عامه در ماه سپتامبر، به تعویق می افتد.

شاروالی ها برای تمدید برنامه واکسیناسیون در حال آماده گی می باشند

برنامه فعلی واکسیناسیون شامل افراد ۱۸ سال (متولد سال ۲۰۰۳) و بزرگتر از آنها می باشد. واکسین کرونا به افراد بین ۱۲ و ۱۸ سال که در معرض بیماری های جدی قرار دارند نیز ارائه می گردد. اگر بعد از ارزیابی های جدید در ماه سپتامبر، انستیتوت صحت عامه توصیه های خود را حفظ کند، با احتمال زیاد جوانان ۱۶ و ۱۷ سال نیز شامل برنامه واکسیناسیون خواهند شد.

به اساس پیشبینی آخر انستیتوت صحت عامه، واکسیناسیون این گروه در ماه اکتوبر تطبیق خواهد شد.

بنت هوپه می گوید: ما می خواهیم شاروالی ها را آماده سازیم که در خزان جوانان ۱۶ و ۱۷ سال را در برنامه واکسیناسیون شامل سازند. برای برنامه ریزی واکسیناسیون این گروه شاروالی ها نیاز به وقت بیشتر دارد و بعد از تطبیق واکسین برای افراد بالاتر از ۱۸ سال، واکسیناسیون این گروه را آغاز نماید.

اکنون تنها تزریق واکسین mRNA فایزر برای این گروه تأیید شده است.

یک زنده گی عادی روزمره

جوانان ۱۶-۱۷ سال با مبتلا شدن به کووید-۱۹ در معرض خطر مبتلا شدن به بیماری های جدی قرار ندارند. همچنین ارقام نشان می دهد که کووید-۱۹ خفیف خطرات کمتر برای جوانان دارد.

در عین حال، ارقام انستیتوت صحت عامه نشان می دهد که جوانان ۱۶-۱۹ سال نسبت به اطفال کوچک بیشتر به کووید-۱۹ مبتلا می شوند. ممکن است دلیل آن این باشد که این گروه نسبت به کودکان و نوجوانان روابط بیشتر با دیگران دارد. ما نمی دانیم که وضعیت پاندمی در خزان و زمستان چگونه خواهد بود و یا هم اینکه عفونت در میان جوانان بر عدم حضور شاگردان در مکاتب و تدابیر وقایوی چه تأثیر خواهد داشت.

بنت هویه می گوید: اگر چه جوانان ۱۶ الی ۱۷ سال به ندرت به اثر کووید-۱۹ شدیداً بیمار می شوند ولی این گروه نسبت به اطفال و نوجوانان بیشتر به کووید-۱۹ مبتلا می شود. همچنان در جریان پاندمی برای این گروه نسبت به دیگران اقدامات و تدابیر بیشتر وضع گردیده است. در مورد فواید و عوارض جانبی تطبیق واکسین برای این گروه باید یک ارزیابی صورت گیرد تا آنها بتوانند به یک زنده گی روزمره عادی با اقدامات و تدابیر محدود قایوی برگردند.